

Bovisan

VORM:	■ capsules: om in te nemen	5	D5
	■ suppo	10	D5
	■ druppels: om in te nemen/inwrijven	5ml	D6
	■ ampullen: om te injecteren	1ml	D6

WERKSTOF:
Mycobacterium bovis D5 (BCG)

EIGENSCHAPPEN:

Deze homeopathische samenstelling bestaat uit celwand fragmenten van afgezwakte mycobacteriën. Dit preparaat veroorzaakt geen infectie zoals gebruikt als entstof, maar levert anderzijds toch immuun modulerende eigenschappen.

INDICATIES:

Ontsteking na BCG-inenting.
Hypertrofie van de amandelen.
Erythema nosodum, tuberculeuze reuma en reumatische gewrichtsklachten.
Asthenie met chronische hypotonie.

AANWENDEN:

innemen: 1 capsule per 2 weken is de normale dosis, doch bij zwakke of uitblijvende reactie maximum 2 capsules/week. Innemen vóór het ontbijt of vóór het slapengaan met wat vloeistof.

suppo: 1 tot 3 x per week 1 suppo vóór het slapengaan.

druppels: 1 x per dag 5-10 druppels nuchter rechtstreeks in de mond of inwrijven 5 druppels in de elleboogplooi. Na 2 maanden gebruik meerdere maanden een therapiepauze inlassen.

injecties: 1-2 x per week 1 ampulle i.m. of s.c. inspuiten.

NEVENWERKINGEN:

Geen bekend

TEGENAANWIJZINGEN:

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor Mycobacterium bovis. Immuun onderdrukkende medicijnen kunnen de werking van Bovisan beïnvloeden. Bij inenting met levende entstoffen Bovisan niet gebruiken binnen een periode van 4 weken voor en na de inenting.

RAADGEVING:

Suppo's beschermen tegen warmte.