

Fortakehl

VORM:	■ druppels: om in te nemen of in te wrijven	10ml	D5
	■ ampullen: om te injecteren	1ml	D5/D6
	■ tabletten: om in te nemen	20	D5
	■ capsules: om in te nemen	20	D4
	■ suppo:	10	D3

WERKSTOF:

Penicillium roquefortii

EIGENSCHAPPEN:

Fortakehl wordt gewonnen uit de schimmel Penicillium roqueforti en is geen antibioticum en bevat of produceert geen penicilline zuur. Hierdoor zijn bijverschijnselen van antibiotica zoals allergieën, leverschade, verstoring van de darmflora en het ontstaan van resistente stammen onbestaande.

INDICATIES:

Symbiose opbouw bij dysbacterie en verstoring van de slijmhuud. Gastritis, enteritis, colitis syndroom met cholecystitis, pancreatitis. Diaree, obstipatie, vomitus, ulcus ventriculi, darm mycosen, vaginale schimmels en huid schimmels.

AANWENDEN:

innemen: 1 x per dag 10 druppels nuchter rechtstreeks in de mond tijdens injectievrije dagen 2x per week 5-10 druppels.

1-3 tabl/dag, tabl laten smelten in de mond.

1-3 caps/dag, caps open maken en in de mond strooien.

inhaleren: 2-3 druppels in gedistilleerd water en 10-20 diepe inhalaties.

inwrijven: 1 x per dag 5-10 druppels aan de ziektehaard of in de elleboogplooï.

injecteren: 2 x per week i.c. of s.c. injecteren.

suppo: 1 suppo per dag vóór slapengaan, rectaal of vaginaal gebruiken.

NEVENWERKINGEN:

Geen bekend

TEGENAANWIJZINGEN:

Geen bekend

RAADGEVING:

Penicillium roqueforti is ook verwerkt in het product Exmykehl.

De suppo beschermen tegen de warmte. Tabletten, capsules en suppo's bevatten lactose.

Bron: Reynaert Research