

Mucokehl

VORM:	■ druppels: om in te nemen of in te wrijven	10ml	D5
	■ ampullen: om te injecteren	1ml	D7/D6/D5
	■ tabletten: om in te nemen	20	D5
	■ capsules: om in te nemen	20	D4
	■ suppo:	10	D3
	■ zalf	30g	D3

WERKSTOF:

Mucor racemosus

EIGENSCHAPPEN:

In de isopathie wordt Mucokehl gebruikt bij alle ziektebeelden die verband houden met bloed- en vaatsystemen of die daar hun oorzaak vinden.

INDICATIES:

Chronische, latente en acute klachten van het vaatsysteem zoals thrombose, embolie, post-infarcten, angina pectoris. Doorbloedingsstoringen en gestoorde wondheling, ulcus cruris, diabetische gangreen. Aderproblemen zoals spataderen, hemorroïden, fistula ani. Ziekten met ontstekingen van organen in het kleine bekken zoals endometritis, prostatitis, colitis syndroom, diverticulitis. Woekeringen van het bindweefsel en in de bekkenorganen zoals cysten, prostaat adenoom, littekenweefsel, zwellingen, distorsies. Glaucoom, cataract. Ophoping van lymfevocht, chronische dermatitis, ischialgie. Aanvangstherapie om de symbiose terug op te bouwen.

AANWENDEN:

innemen: 1 x per dag 10 druppels nuchter rechtstreeks in de mond. 1-3 tabl/dag, tabl laten smelten in de mond.

1-3 caps/dag, caps open maken en in de mond strooien.

inhaleren: 2-3 druppels in gedistilleerd water en 10-20 diepe inhalaties.

inwrijven: 1 x per dag 5-10 druppels aan de ziektehaard of in de elleboogplooi.

injecteren: 2 x per week i.m., i.v., i.c. of s.c. injecteren.

suppo: 1 suppo per dag vóór slapengaan, rectaal of vaginaal gebruiken.

zalf: 1-3 x per dag dun uitsmeren op het betreffende huiddeel.

NEVENWERKINGEN: Geen bekend

TEGENAANWIJZINGEN: Geen bekend. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de schimmel Mucor racemosus.

RAADGEVING: Capsules, tabletten en suppo's bevatten lactose. Suppo's beschermen tegen warmte. Mucokehl is ook aanwezig in het product Sankombi.

Bron: Reynaert Research