

Notakehl

VORM:	■ druppels: om in te nemen of in te wrijven	10ml	D5
	■ ampullen: om te injecteren	1ml	D7/D6/D5
	■ tabletten: om in te nemen	20	D5
	■ capsules: om in te nemen	20	D4
	■ suppo:	10	D3
	■ zalf	30g	D3

WERKSTOF:
Penicillium chrysogenum

EIGENSCHAPPEN:
Notakehl wordt gewonnen uit de schimmel Penicillium chrysogenum en wordt toegepast bij alle bacteriële infecties. Notakehl is geen antibioticum en produceert geen antibiotische substanties. Er treden dus ook geen bijverschijnselen op zoals bij het gebruik van antibiotica. Daardoor zijn leverschade, verstoring van de darmflora, het vormen van penicillinezuur en het ontstaan van penicilline resistente stammen niet aanwezig.

INDICATIES:
Bacteriële aandoeningen van allerlei aard zoals angina tonsillaris, laryngitis, otitis. Infecties in het uro-genitaal gebied zoals cystitis, prostatitis, endometritis. Infecties aan de luchtwegen zoals astma-bronchitis, bronchitis, sinubronchitis. Neuritis, neuralgiën, lumbaal syndroom. Eteringen, acne, ontstekingen aan de tanden, gewrichtsontstekingen en ontstekingen aan de wervelkolom. Herpes zoster.

AANWENDEN:
innemen: 1 x per dag 10 druppels nuchter rechtstreeks in de mond.
1-3 tabl/dag, tabl laten smelten in de mond.
1-3 caps/dag, caps open maken en in de mond strooien.
inhaleren: 2-3 druppels in gedistilleerd water en 10-20 diepe inhalaties.
inwrijven: 1 x per dag 5-10 druppels aan de ziektehaard of in de elleboogplooi.
injecteren: 2 x per week i.m., i.v., i.c. of s.c. injecteren.
suppo: 1 suppo per dag vóór slapengaan, rectaal of vaginaal gebruiken.
zalf: 1-3 x per dag dun uitsmeren op het betreffende huiddeel.

NEVENWERKINGEN: Notakehl niet gelijktijdig gebruiken met Mucokehl.

TEGENAANWIJZINGEN: Geen bekend. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de schimmel Penicillium chrysogenum.

RAADGEVING: Capsules, tabletten en suppo's bevatten lactose.
Suppo's en zalf beschermen tegen warmte.

Bron: Reynaert Research