

Recarcin

VORM:	■ druppels: om in te nemen/inwrijven	5ml	D6
	■ capsules: om in te nemen	5	D6/D4
	■ ampullen: om te injecteren	1ml	D6/D4
	■ suppo:	10	D6

WERKSTOF:

Bacillus firmus

EIGENSCHAPPEN:

Recarcin wordt gewonnen uit voor de mens apathogene Bacillus firmus. Het wordt vooral bij chronische infectiegevoeligheid ingezet als een niet-specifieke immuunmodulator.

INDICATIES:

Subacute en chronische ontstekingen van de klieren en sereuze huid.
Arthritis, arthrose.
Infectiegevoeligheid.

AANWENDEN:

innemen: 1-3 x per week 2-5 druppels rechtstreeks in de mond.

1-2 x per week 1 capsule innemen met wat water 2u voor ontbijt.

inwrijven: 1-3 x per week 2-5 druppels in de elleboogplooï. Niet op ontstoken huid inwrijven.

injecteren: 1-2 x per week 1ml i.m., of s.c. injecteren.

NEVENWERKINGEN:

Bij de injecties kunnen lokale reacties optreden die uit zichzelf verdwijnen, soms ook lichte temperatuurverhoging en moeheid.

TEGENAANWIJZINGEN:

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor Bacillus firmus en bij koorts en verzwakte toestanden.

RAADGEVING:

Bij inenting met entstoffen Recarcin niet gebruiken binnen een periode van 2 weken voor en na de inenting. Bij gelijktijdig gebruik van immuunonderdrukkende medicijnen kan de werking van Recarcin beïnvloed worden.

Capsules en suppo's bevatten lactose en suppo's beschermen tegen warmte.