

Utilin "S"

VORM:	■ druppels: om in te nemen of in te wrijven	5ml	D6
	■ ampullen: om te injecteren	1ml	D6/D4
	■ capsules: om in te nemen	5	D6/D4
	■ suppo:	10	D6

WERKSTOF:

Mycobacterium phlei F.U. 36 (DSM4817)

EIGENSCHAPPEN:

Utilin "S" (zuurvast) wordt uit een voor de mens niet-pathogene kiem gemaakt en moduleert het immuunsysteem.

INDICATIES:

Chronische longaandoeningen, Chronische koortstoestanden met nachtzweten en zwaktetoestanden, Als imuunmodulator, Bij subfebriele of lichte koorts.

AANWENDEN:

innemen: 1-3 x per week 2-5 druppels rechtstreeks in de mond en voor de capsules 1-2 x per week 1 capsule met water 2u vóór ontbijt.

inwrijven: 1-3 x per week 2-5 druppels in de elleboogplooi.

injecteren: 1-2 x per week i.m. of s.c. injecteren.

suppo: 1-3 x per week vóór slapengaan.

NEVENWERKINGEN:

Er kunnen wat overgevoeligheidsreacties optreden en lokale reacties rond de plaats van de inspuiting, die echter spontaan terug verdwijnen

TEGENAANWIJZINGEN:

Niet gebruiken bij koorts en zwakte toestanden en niet inwrijven op een ontstoken huid. Bij gelijktijdig gebruik van immuun onderdrukkende medicatie kan de werking van Utilin "S" beïnvloed worden. Minstens 2 weken wachten na een inenting om Utilin "S" te gebruiken.

RAADGEVING:

Capsules en Suppo bevatten lactose.