

# Utilin

<b>VORM:</b>	■ druppels: om in te nemen of in te wrijven	5ml	D6
	■ ampullen: om te injecteren	1ml	D6/D4
	■ capsules: om in te nemen	5	D6/D4
	■ suppo:	10	D6

**WERKSTOF:**  
Bacillus subtilis M.U. 345 (DSM 5330)

**EIGENSCHAPPEN:**  
Utilin wordt uit een niet-pathogene stam van Bacillus subtilis gemaakt. Het is een mild prikkel therapeuticum gebruikt als niet-specifieke immuunmodulator.

**INDICATIES:**  
Subacute en chronische ontstekingen, Functiestoornissen van de darmen, Lever- en galblaas storingen, Als immuunmodulator, Post menopauze syndroom, ziekte van Basedow.

**AANWENDEN:**  
*innemen:* 1-3 x per week 2-5 druppels rechtstreeks in de mond en voor de capsules 1-2 x per week 1 capsule met water 2u vóór ontbijt.  
*inwrijven:* 1-3 x per week 2-5 druppels in de elleboogplooi.  
*injecteren:* 1-2 x per week i.m. of s.c. injecteren.  
*suppo:* 1-3 x per week vóór slapengaan.

**NEVENWERKINGEN:**  
Er kunnen wat overgevoeligheidsreacties optreden en lokale reacties rond de plaats van de inspuiting, die echter spontaan terug verdwijnen.

**TEGENAANWIJZINGEN:**  
Niet gebruiken bij koorts en zwakte toestanden en niet inwrijven op een ontstoken huid. Bij gelijktijdig gebruik van immuun onderdrukkende medicatie kan de werking van Utilin beïnvloed worden. Minstens 2 weken wachten na een inenting om Utilin te gebruiken.

**RAADGEVING:**  
Capsules en Suppo bevatten lactose.